



Original Research

A Comparison of General Health of Active and Inactives Teacher's from Chamestan City

Ali Akbar Mashayekh^{1*}, Ali Reza Hoseini²

1. Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Islamic Azad University, Noor Branch, Noor, Iran

2. Master, Department of Clinical Sports Physiology, Islamic Azad University, Noor Branch, Noor, Iran

ARTICLE INFO

Received: 2020/04/07

Revised: 2020/04/24

Accepted: 2020/05/06

Keyword:

General health

Physical health

Stressed and sleepless

Social functions

Depression

ABSTRACT

Introduction & Purpose: The aim of this study was to investigate the general health of active and inactive teachers in Chamestan.


Methodology: To this end, 248 working teachers in Chamestan, two public health questionnaires Goldberg and Hiller (GHQ) to measure the four subscales of physical health, anxiety and sleep disorders, social functions and depression, and Beck questionnaire to measure physical activity. Completed.

Results: The UM-Whitney test for comparing groups showed that active teachers in Chamestan compared to inactive teachers in Chamestan had higher general health, better physical health, less anxiety and sleep disorders, better social functioning, and lower levels of depression. (01 / p.). The general health and its sub-indicators of active teachers are higher than those of inactive teachers are.

Conclusion: Physical activity as an important tool for maintaining the health of society can be used in the treatment and prevention of various physical diseases and equally in the control and treatment of mental problems such as depression, anxiety and sleep disorders.

* Corresponding Author: Ali Akbar Mashayekh, Master of Pathology and Corrective Movements, Urmia University, Urmia, Iran

Email: mashayekh.pe@gmail.com



بررسی سلامت عمومی معلمان فعال و غیر فعال شهر چمستان

علی اکبر مشایخ^{۱*}، علیرضا حسینی^۲

۱. دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

۲. گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، نور ایران. مرکز تحقیقات مهندسی کیفیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده

اطلاعات مقاله

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش بررسی سلامت عمومی معلمان فعال و غیر فعال شهر چمستان بود.
روش شناسی: به این منظور، 248 نفر از معلمان شاغل شهر چمستان، دو پرسشنامه سلامت عمومی گلدبُرگ و هیلر (GHO) برای اندازه گیری چهار خرده مقیاس سلامت جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، کارکردهای اجتماعی و افسردگی و پرسشنامه بک برای سنجش سطح فعالیت بدنی را تکمیل کردند.

دریافت مقاله: 99/01/19

پارنگری مقاله: 99/02/05

پذیرش مقاله: 99/02/17

نتایج: آزمون یو من ویتنی برای مقایسه گروه ها نشان داد که معلمان فعال شهر چمستان در مقایسه با معلمان فعال شهر چمستان غیر فعال دارای سلامت عمومی بالاتر، سلامت جسمانی بهتر، اضطراب و اختلال خواب کمتر، کارکردهای اجتماعی مطلوب تر و دارای سطح افسردگی کمتر می باشند ($p < 0.01$). سلامت عمومی و زیر شاخص های سلامت عمومی معلمان فعال بالاتر از معلمان غیر فعال است. **نتیجه گیری:** فعالیت جسمانی به عنوان یک ابزار مهم برای حفظ بهداشت و سلامتی جامعه می تواند در درمان و پیشگیری از بیماری های مختلف جسمانی و به همان میزان در کنترل و در درمان مشکلات روانی مثل افسردگی و اضطراب و اختلال خواب مورد استفاده واقع شود.

کلید واژگان

سلامت عمومی

سلامت جسمانی

اضطراب و اختلال خواب

کارکردهای اجتماعی

افسردگی

مقدمه

های غیر فعال بودند(54). تاکور و همکاران¹⁰ (2004) در پژوهشی بیان کردند که بین میزان فعالیت بدنی و فشار خون همبستگی منفی و ضعیفی وجود دارد(47). دی کاروالیو و فیلیو¹¹ (2004) نشان می دهند که یک برنامه تمرینی می تواند فوایدی مرتبط با توسعه عملکرد جسمانی، کاهش افسردگی، جلوگیری از افت عملکرد روانی در افراد سالمند داشته باشد و موجب بهبود کیفیت زندگی و تندرستی گردد(65). چتل¹² (2004) بیان می کند که تمرینات هوایی موجب سلامت روانی می گردد و مشکلات روانی و جسمانی را کاهش می دهد و موجب بهبود خلق و خوشی و رفتار می شود. همچنین پدید آمدن خلق بهتر پس از فعالیت جسمانی، نتیجه تولید مواد نشاط آوری است که در اثر ورزش تولید می شود(76). بونهاوزر و همکاران¹³ (2005) نیز بیان کردند که فعالیت بدنی با خطر کمتر انواع مرگ و میرهای ناشی از بیماری های قلبی-عروقی و همچنین در پیشگیری و کنترل فشارهای عاطفی و بهبود خودپنداری مرتبط می باشد(پالوسکا و شونک¹⁴, 2000). ریچارد سون و همکاران¹⁵ (2005) نیز در تحقیق خود عنوان کردند که ورزش می تواند عالیم ثانویه افسردگی، خود پنداره و سرخوردگی اجتماعی را تسکین دهد(95). پلوسو و آندراد¹⁶ (2005)، نیز بیان می کنند که فعالیت جسمانی به عنوان یک ابراز مهم برای حفظ بهداشت و سلامتی جامعه می تواند در درمان و پیشگیری از بیماری های مختلف جسمانی و به همان میزان در کنترل و درمان مشکلات روانی مثل افسردگی و اضطراب مورد استفاده واقع شوند. هامر و همکاران¹⁷ (2008) در مرکز تحقیقات اسکالتلند و رایت و همکاران¹⁸ (2009) نشان دادند که افرادی که فعالیت های منظم ورزشی شرکت می کردند، خطر کمتری در خصوص ابتلا به اختلالات روانی از خود نشان دادند و مشکلات ذهنی و روحی کمتری آنان را تهدید می دادند که فعالیت های ورزشی بسته سن، جنسیت، کار و شرکت در انواع فعالیت های ورزشی می تواند در سلامت روانی و جسمانی افراد تاثیر معناداری دارد (استر سرینا، او لزیب، تاکمی سوگیاماک و نویل اونسن²¹, 2009). همچنین نتایج مطالعات فیشر و همکاران(1996)، فوستر(1997) و عدهای دیگر از تحقیقات انجام شده در این زمینه که معتقدند که فعالیت های حرکتی و ورزشی بر سلامت افراد تاثیر ندارد (بونهاوزر، فرنانdez، پوشچل، یانز اف، مونترو جی، تامپسون، کرونادو²², 2005). بررسی ها نشان می دهد که

استعداد فرد برای خوب زیستن و عمل کردن به طور موثر و از روی میل، برخورد کردن به شیوه ای مطمئن با مسایل و مشکلات و بحران ها در تعریف سلامتی¹ به چشم می خورد(اویرر، کوفر, 1994²). روان شناسان و متخصصان ورزشی همواره بر نقش حیاتی ورزش و فعالیت بدنی بر توسعه توانایی های جسمانی ارتقای عملکرد اجتماعی، کاهش افسردگی³ و اضطراب⁴ و سایر عوامل روانی تاکید می کنند. آنها معتقدند افسردگی، اضطراب، بی خوابی و عدم تعادل روانی همواره سلامت روانی انسان را تهدید می کند و قوای بدنی و روانی او را به تحلیل می برد(تسوتسمی، دون، زایچکوفسکی، دلیزونا⁵, 1997). فعالیت های ورزشی، دارای آثار روانی فراوانی هستند که از جمله آنها می توان به کاهش اضطراب، کاهش افسردگی، ایجاد محافظت و مقابله با فشار روانی، افزایش حرمت خود، بهبود خلق و خو و توسعه سلامت روانی اشاره کرد(سالمون⁶, 2001). اضطراب شایع ترین بیماری با حالات روانی است که هر فرد ممکن است گهگاه آن را تجربه کند(آندراده⁷, 2005). این بیماری در دهه های اخیر، بسیاری از دانشمندان و محققین را بر آن داشت تا قرن بیستم را قرن اضطراب معرفی کند(گنجی، رجبی، غفاری, 1384). اضطراب احساس ناخوشایند و ناراحت کننده ای است که با شناخته های جسمی ناشی از بیش فعالی دستگاه عصبی خود کار همراه است(رحیمی, 138). افسردگی از مهمترین بیماری های روانشناسی است که در بررسی حالات روانی ، مورد توجه بسیاری از محققین قرار دارد. همچنین متخصصین بهداشت روانی اتفاق نظر دارند که افسردگی شایع ترین و اساسی ترین بیماری روانی در دوهه اخیر بوده است. مطابق آمارهای بین المللی، 15 درصد افراد بالغ بین سنین 15 تا 74 سال دارای عالیم بارز افسردگی هستند(غفاری مظفر, 1384). تحقیقات علمی نشان می دهند، کمیود حرکت موجب ضعف دستگاه گردش خون و تنفسی شده و از عوامل سکته قلبی محسوب می گردد. چاقی، افزایش چربی خون و ناهنجاری هایی در دستگاه های گوارش و اعصاب نیز می تواند تحت تاثیر این عامل باشد(غنی، 1381).

کوهل⁸ (2002) ثابت کرد که شرکت در فعالیت های منظم ورزشی باعث کاهش افسردگی و بهبود بهداشت روانی و توسعه سلامتی ورزشکاران می شود(77). آرینو و همکاران⁹ (2002) در تحقیق خود چنین نتیجه گرفتند که آزمدندی های فعال دارای سلامت عمومی بهتر و روابط اجتماعی مناسب تری نسبت به آزمودنی

13. Bounhavere and et al

14. Paluska.Schwenk

15. Richardson and et al

16. Peluso and Andrad

17. Hamer and et al

18. Wrighta and et al

19. Ferezza, EE: Shebani,

20. Ester Cerina and et al

21. Ester Cerina, Eva Leslieb, Takemi Sugiyamac and Neville

Owenc

22. Bonhauser , Fernandez, Puschel , Yanez, Montero , Thompson , Coronado,

1. Safety

2. Weyerer , Kupfer

3. Depression

4. Anxiety

5. Tsutsumi , Don, Zaichkowsky , Delizonna

6. Salmon

7. Andrade

8. Kohl

9. Aarnio

10. Takur and et al

11. De carvalho and Filho

12. Knechtle

اختلال خواب، اختلال در کنش وری اجتماعی و افسردگی شدید است. برای امتیاز گذاری و تعیین نمره نهایی سلامت روانی آزمودنی‌ها از مدل ساده لیکرت استفاده شد، به این ترتیب که داده از کمترین به بیشترین و با نمره‌های ۰, ۱, ۲ و ۳) تنظیم شدند. در این روش امتیاز پایین نشان دهنده سلامتی و امتیاز بالا نشانگر اختلال است. به این صورت که در هر مقیاس از نمره ۶ و در مجموع از نمره ۲۲ به بالا بیانگر علایم اختلال است (کاشف میرمحمد، ۱۳۸۵). گلدبگ و بلک⁴ با استفاده از پرسشنامه مذکور توانستند بیش از ۰/۹۰ نمونه را به درستی به عنوان بیمار و سالم طبقه بنده نماید. به علاوه ضریب همبستگی بین نمرات این پرسشنامه با نتیجه ارزیابی بالینی شدت اختلالات، به میزان ۰/۸۰ + گزارش شده است. یعقوبی (۱۳۷۵) نیز در روازای GHQ 28 حساسیت و ویژگی این آزمون در بهترین نقطه برازش را به ترتیب برابر با ۰/۸۶ و ۰/۸۲ گزارش نموده است (فضل بخششی، ۱۳۷۹). پالاهنگ (۱۳۷۴) ضریب اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه ۲۸ ماده ای سلامت عمومی را با استفاده از روش باز آزمایی به میزان ۰/۹۱ برآورد نمود. یعقوبی (۱۳۷۴) نیز ضریب اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه ۲۸ ماده ای سلامت عمومی را با استفاده از روش باز آزمایی به میزان ۰/۸۸ برآورد نموده است. یزدان پناه (۱۳۷۵) ضریب ثبات درونی پرسشنامه ۲۸ ماده ای سلامت عمومی را، با روش آلفای کرونباخ به میزان ۰/۹۲ برآورد نموده است. بنابراین پرسشنامه سلامت عمومی روایی و پایایی لازم برای استفاده در این تحقیق را دارا می‌باشد.

بعد از توزیع و جمع آوری پرسشنامه‌ها، شرکت کنندگان با توجه به امتیاز کسب شده از پرسشنامه بک در دو گروه معلم فعل و غیر فعل تقسیم شدند و مقایسه سلامت عمومی و زیر شاخصهای آن بین دو گروه معلم و بالاتر تقسیم شده است. همه تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. سطح معناداری در آزمون‌های آماری ۰,۰۵ در نظر گرفته شد.

نتایج

سطح تحصیلات معلمان شرکت کننده در تحقیق در ۳ طبقه فوق دیپلم و پایینتر، لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر تقسیم بندی و مورد بررسی قرار گرفت. ۲ از بین ۲۴۲ نفر آزمودنی شرکت کننده در تحقیق ۹ نفر دارای مدرک فوق دیپلم و پایینتر، ۱۸۶ نفر لیسانس و ۴۷ نفر فوق لیسانس و بالاتر بوده‌اند. اطلاعات مربوط به سابقه کار آزمودنیها به صورت تفکیک شده در جدول ۱ آورده شده است.

ورزش تا میزان زیادی باعث ایجاد تعلق اجتماعی و افزایش سطح سلامتی جامعه می‌گردد. از این رو اگر سیاستگزاران بخواهند سلامت جسمانی و روانی شهروندان خود را تامین کنند، لازم است به ورزش به عنوان یک ابراز مهم اثر گذار توجه کنند (پور سلطانی، ۱۳۸۲). مرور پیشینه تحقیقات نشان می‌دهد که شرکت در ورزشهای گروهی و انفرادی موجب ارتقای سلامتی و بهبود بهداشت روانی و جسمانی ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران می‌شود (حجازی، ۱۳۸۷). همچنین نتایج تحقیقات حاکی از آن است که ورزش و فعالیت‌های بدنی بر بهداشت روانی، خودکار آمدی، کیفیت زندگی، کاهش اضطراب و افسردگی، رشد عزت نفس، بهزیستی، و کاهش اختلالات روان شناختی اثر می‌گذارد (تلراجیان و روزبهانی ۱۳۹۷). معلمان قشر زحمتکشی هستند که از نظر اقتصادی در طبقه متوسط جامعه قرار می‌گیرند و مشکلات صنفی سالیان اخیر منجر شده است که فشار اجتماعی اقتصادی مضعافی را متحمل شوند. لذا مطالعه راهبردهای جایگزین برای ارتقای سلامت آن باید مورد مطالعه قرار گیرد. هدف این پژوهش آن است که پتانسیل فعالیت بدنی و ورزش برای ارتقای سلامت عمومی معلمان را مور بررسی قرار دهد.

روش شناسی

این تحقیق میدانی با روش علی مقایسه‌ای به توصیف سلامت عمومی و فعالیت بدنی معلمان پرداخته است. تعداد جامعه تحقیق شامل کلیه معلمان شاغل شهر چمستان می‌باشد که طبق برآورد اداره آموزش و پرورش برابر با ۶۸۴ نفر می‌باشد. بر اساس جدول مورگان نمونه آماری شامل ۲۴۸ نفر به صورت تصادفی انتخاب شد.

ابزار اندازه گیری این تحقیق شامل ۲ پرسشنامه می‌باشد: پرسشنامه فعالیت بدنی بک¹ شامل ۱۶ سوال است که میزان سطح فعالیت بدنی آزمودنی‌ها را در سه بخش: فعالیت بدنی اوقات فراغت، فعالیت ورزشی و فعالیت بدنی مربوط به شغل تنظیم شده که به صورت امتیاز دهی لیکرت از امتیازهای ۱ الی ۵ برای سوالات در نظر گرفته شده است.

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)² یک پرسشنامه مبتنی بر روش خودگزارش دهی است که به تناسب شرایط فرهنگ‌های مختلف، فرم‌های کوتاه تری از آن نیز تهیه شده است. فرم ۲۸ ماده‌ای GHQ توسط گلدبگ و هیلر³ در سال (۱۹۷۹)، تدوین شده است. این پرسشنامه از نوع پاسخ بسته، شامل ۲۸ سوال و هر کدام از سؤالات چهار گزینه‌ای است که هر آزمودنی یکی از گزینه‌ها را انتخاب می‌نماید. بنابراین استخراج داده‌ها به راحتی و به سهولت انجام گرفته است. این پرسشنامه دارای چهار مقیاس علائم جسمانی، اضطراب و

3. Gold Berg and Hiler

1. beck(Questionnaire Activity physical Beck)

2. General Health Questionnaire

جدول 1. توزیع سابقه کار آزمودنی های تحقیق

درصد	تعداد	سطح تحصیلات
9,9	24	کمتر از 7 سال
20,2	49	8 الی 15 سال
22,3	54	15 الی 23 سال
47,5	115	بالاتر از 23 سال

اطلاعات مربوط به سابقه کار آزمودنیها به صورت تفکیک شده در جدول 2 آورده شده است.

جدول 2. توزیع میزان درآمد آزمودنی های تحقیق

درصد	تعداد	سطح تحصیلات
15,7	38	زیر 1/500/000 تومان
36	87	1/500/000 الی 2/200/000 تومان
36	87	2/200/000 الی 3/000/000 تومان
12,4	30	بالاتر از 3/000/000 تومان

کارکرد اجتماعی و افسردگی) در بین معلمان فعال و غیر فعال در جدول 3 ارائه شده است.

تصویف متغیرهای اصلی تحقیق
میانگین امتیاز سلامت عمومی و شاخصهای شاخصهای سلامت عمومی (سلامت جسمانی، اضطراب و اختلال خواب،

جدول 3. تصویف متغیر سلامت عمومی و شاخصهای سلامت عمومی در بین معلمان فعال و غیر فعال

معلمان غیر فعال	معلمان فعال	متغیرها
22,79	18,33	میانگین سلامت عمومی
6,69	5	میانگین سلامت جسمانی
7,08	5,31	میانگین اضطراب و اختلال خواب
6,52	5,49	میانگین کارکرد های اجتماعی
3,07	2,06	میانگین افسردگی

استفاده شد که نتایج آن را در جدول 4 مشاهده می کنید.

برای مقایسه سلامت عمومی و خرد مقياسه های آن بین معلمان فعال و غیرفعال شهر چمشستان از آزمون یومن ویتنی

جدول 4. مقایسه سلامت عمومی معلمان فعال و غیرفعال شهر چمشستان

P value	Z	U - Mann - Whitney	میانگین رتبه	آماره گروه
0/001	3,47	5186,500	134,79	معلمان فعال
			103,86	معلمان غیر فعال

P≤0/01**

بر اساس جدول 5، در بررسی مقایسه سلامت جسمانی معلمان فعال و غیر فعال شهر چمشستان، فرضیه صفر در سطح معناداری 0,002 رد می شود . به عبارت دیگر بین سلامت عمومی معلمان فعال و غیر فعال شهر چمشستان تفاوت معناداری وجود دارد.

بر اساس جدول 4، در بررسی مقایسه سلامت عمومی معلمان فعال و غیر فعال شهر چمشستان، فرضیه صفر در سطح معناداری 0,001 رد می شود . به عبارت دیگر بین سلامت عمومی معلمان فعال و غیر فعال شهر چمشستان تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول 5. مقایسه سلامت جسمانی معلمان فعال و غیر فعال شهر چمشستان

P value	Z	U - Mann - Whitney	میانگین رتبه	آماره گروه
0/002	3,10	5586,500	135,16	معلمان فعال
			107,42	معلمان غیر فعال

می شود . بنابراین در نمره میزان اضطراب و اختلال خواب بین معلمان فعال و غیر فعال شهر چمستان تفاوت معناداری وجود دارد.

نتایج آزمون یو من ویتنی برای مقایسه میزان اضطراب و اختلال خواب معلمان فعال و غیر فعال شهر چمستان در جدول 6 ارائه شده است. فرضیه صفر در سطح معناداری 0/001 رد

جدول 6. مقایسه میزان اضطراب و اختلال خواب معلمان فعال و غیر فعال شهر چمستان

P value	Z	U - Mann - Whitney	میانگین رتبه	آماره گروه
0/0001	3,48	5231,500	135,40	معلمان فعال
			104,38	معلمان غیر فعال

شود . بنابراین در کارکرد اجتماعی ، بین معلمان فعال و غیر فعال شهر چمستان تفاوت معناداری وجود دارد.

نتایج آزمون یو من ویتنی برای مقایسه میزان اضطراب و اختلال خواب معلمان فعال و غیر فعال شهر چمستان در جدول 7 ارائه شده است. فرضیه صفر در سطح معناداری 0/001 رد می

جدول 7. مقایسه کارکرد اجتماعی معلمان فعال و غیر فعال شهر چمستان

P value	Z	U - Mann - Whitney	میانگین رتبه	آماره گروه
0/001	3,26	5403	134,92	معلمان فعال
			105,93	معلمان غیر فعال

بنابراین در نمره میزان اضطراب و اختلال خواب بین معلمان فعال و غیر فعال شهر چمستان تفاوت معناداری وجود دارد.

نتایج آزمون یو من ویتنی برای مقایسه میزان افسردگی معلمان فعال و غیر فعال شهر چمستان در جدول 8 ارائه شده است. فرضیه صفر در سطح معناداری 0/001 رد می شود.

جدول 8. مقایسه میزان افسردگی معلمان فعال و غیر فعال شهر چمستان

P value	Z	U - Mann - Whitney	میانگین رتبه	آماره گروه
0/001	3,87	5089	137,43	معلمان فعال
			103,29	معلمان غیر فعال

گونان اعلام کردند که گزارش کردند که تغییر در بهداشت روانی با بهبود سبک زندگی و سلامت جسمانی رابطه معنی داری دارد. این یافته تاییدی است بر این که آمادگی جسمانی بالاتر با میزان بیشتر ورزش کردن مرتبط است و شرکت در فعالیت های ورزشی به صورت منظم در ارتقای سطح آمادگی جسمانی و شادابی موثر و مفید است. احتمالاً فعالیت بدنی سبک و ملایم موجب شده است که آزمودنی احساس و درک مثبتی از سلامتی واقعی یا تصویر سلامتی داشته باشد. این موضوع حتی با پیشینه فراوان در مورد نقش درمانی ورزش نیز همراه است. بدون تردید، هدف سلامتی، تدرستی و آمادگی جسمانی اولین و بالاترین هدف تربیت بدنی و ورزش برای کلیه گروه های سنی و اجتماعی قرار گرفته است. علاوه بر این ، این تحقیق نشان داد که، در اضطراب و اختلال خواب را در بین معلمان فعال و غیر فعال تفاوت معنی داری وجود دارد. حداد (1376) ، احمدی (1379) ، فاضل بخششی (1379) ، غرایاق زندی (1380) ، غنی (1381) ، و رحیمی گلوگاهی (1381) ، پور سلطانی (1382) ، کاشف و مظفری (1385) در شرکت کنندگان و طرح های تحقیقی مختلف نیز همخوانی دارد. همچنین تسوتسومی و همکاران (1997) ، کرکالدی و شفارد (2002) ، دی کاروالیو و فیلیو (2004) ، ایشی هارا و همکاران (2005) ، نیز در طرح های تجربی مختلف در جوامع

بحث

میانگین امتیاز سلامت جسمانی در بین معلمان غیر فعال 6,69 بوده و این میانگین در بین معلمان فعال 5 می باشد. با توجه به اینکه میانگین های بالاتر نشانه اختلال است بنابراین کاهش در میانگین ها نشان دهنده بالاتر بودن وضعیت سلامت جسمانی در بین معلمان فعال می باشد. به علاوه نتایج آمار استنباطی در خصوص سلامت جسمانی مردان نشان داد که در سلامت جسمانی بین معلمان فعال و غیر فعال تفاوت معنی داری وجود دارد. این یافته طبیعی با نتایج حداد (1376) ، احمدی (1379) ، فاضل بخششی (1379) ، غرایاق زندی (1380) ، غنی (1381) ، رحیمی گلوگاهی (1381) ، پور سلطانی (1382) ، کاشف و مظفری (1385) در شرکت کنندگان و طرح های تحقیقی مختلف نیز همخوانی دارد. همچنین تسوتسومی و همکاران (1997) ، کرکالدی و شفارد (2002) ، دی کاروالیو و فیلیو (2004) ، ایشی هارا و همکاران (2005) ، نیز در طرح های تجربی مختلف در جوامع

بنابراین کمتر بودن میانگین نشان دهنده بهتر بودن وضعیت افسردگی می تواند ناشی از شرکت در تمرینات هوایی می باشد. که این نتیجه با نتیجه بسیاری از تحقیقات همخوانی دارد.

از جمله تحقیقاتی که نتایج مشابه با این نتیجه را ذکر کردن می توان به نتایج تحقیق احمدی (1379) در بین دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار سنتندج، فاضل بخششی (1379) در بین معتادین زندان مرکزی استان سیستان و بلوچستان، غرایاق زندی (1380) در بین جانبازان ورزشکار و غیر ورزشکار، غنی (1381) در بین همسران پاسدار شهر تهران، رحیمی گلوگاهی (1381)، در بین دانش آموزان پسر، پور سلطانی (1382) بین جانبازان و معلولین جسمانی ورزشکار و غیر ورزشکار، کاشف و مظفری (1385) در بین اعضای هیأت علمی فعال و غیر فعال حرکتی اشاره کرد.

به علاوه نتایج مطالعه غفاری (1384) نشان می دهد که میزان افسردگی غیر ورزشکاران بیشتر از ورزشکاران حرفه ای و غیر حرفه ای است و گنجی و همکاران (1384) نشان دادند که میزان افسردگی در دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر بوده است و علت این مسئله را به ویژگی های محیطی نسبت داده اند ویرر و کوپفر (1994)، بیان می کنند که سلامت روانی و خصوصاً افسردگی با ورزش هوایی در کنار مشاوره، بهتر از مشاوره بهبود می یابد. پالوسکا و شوینک (2000)، در مقاله ای بیان کردن که فعالیت جسمانی می تواند نقش مهمی در کنترل علایم خفیف تا متوسط روانی به خصوص افسردگی و اضطراب بازی کند.

دان تیریوری و همکاران (2001)، نشان دادند که میزان شرکت در تغیرات ورزشی و فعالیت بدنی به طور عمدۀ با کاهش علایم افسردگی ارتباط دارد. دی کاروالیو و فیلیو (2004)، نیز نشان دادند که یک برنامه تمرینی می تواند فوایدی مرتبط با توسعه عملکرد جسمانی، کاهش افسردگی، جلوگیری از افت عملکرد روانی در افراد سالم‌مند داشته باشد و موجب بهبود کیفیت زندگی و تندروستی گردد. و در آخر از نظر استر کرینا و همکاران (2009) فعالیت های ورزشی بسته سن، جنسیت، کار و شرکت در انواع فعالیت های ورزشی می تواند در سلامت روانی و جسمانی افراد تاثیر معناداری پذیرد بنابراین با جمع بندی نتایج محققین فوق فعالیت جسمانی به عنوان یک ابزار مهم برای حفظ بهداشت و سلامتی جامعه می تواند در درمان و پیشگیری از بیماری های مختلف جسمانی و به همان میزان در کنترل و در درمان مشکلات روانی مثل افسردگی و اضطراب مورد استفاده واقع شود.

در میزان سلامت عمومی نیز بین معلمان فعال و غیر فعال تفاوت معنی داری وجود دارد. در همین راستا نتایج تحقیقات حداد (1376)، احمدی (1379)، فاضل بخششی (1379)، غرایاق زندی (1380)، پور سلطانی (1382) و کاشف و مظفری (1385) با استفاده از پرسشنامه GHQ سلامت عمومی نشان داد که شرکت کنندگان فعال در وضعیت بهتر و مطلوبتری نسبت به جامعه غیر فعال می باشد. همچنین ابراهیم و حیدری (1383)

پور سلطانی (1382)، کاشف و مظفری (1385) با استفاده از پرسشنامه مذکور نیز نتایج مشابهی گزارش کردند. اکابر و یانگ اشتات (1995)، هم بیان کردند که کیفیت خواب در افراد فعال از نظر جسمانی در مقایسه با افراد غیر فعال بهتر است. کارمک بودرا و همکاران (1999)، فعالیت بدنی تغیریخی و آمادگی هوایی را به عنوان عامل برطرف کننده اضطراب و استرس خفیف در دانشجویان می دانند. از نظر پالوسکا و شوینک (2000)، فعالیت جسمانی می تواند نقش مهمی در کنترل علایم خفیف تا متوسط روانی به خصوص افسردگی و اضطراب بازی کند. سالمون (2001)، نیز بیان کرد با اینکه اثرات فعالیت بدنی به طور عمدۀ در ورزش های هوایی مطالعه شده است، اما شواهد بیان می کنند که فعالیت جسمانی بی هوایی مثل بدنسازی یا تمرینات انعطاف پذیری هم می تواند علایم افسردگی را کاهش دهد. در تحقیق مک آولی و همکاران (2002)، به این نتایج رسیدند که در شش و دوازده ماه بعد از اجرای برنامه تجربی، کاهش معنی داری را در سطح اضطراب، بهبود و خود کارآمدی و آمادگی جسمانی رسیدند. از نظر گودوین (2003) و پلوسو و آندراد (2005) فعالیت جسمانی منظم با کاهش معنی دار افسردگی و اضطراب مرتبط است. فعالیت جسمانی به عنوان یک ابزار مهم برای حفظ بهداشت و سلامتی جامعه می تواند در درمان و پیشگیری از بیماری های مختلف جسمانی و به همان میزان در کنترل و در درمان مشکلات روانی مثل افسردگی و اضطراب و اختلال خواب مورد استفاده واقع شود.

یافته دیگر این تحقیق آن بود که در کارکردهای اجتماعی بین معلمان فعال و غیر فعال تفاوت معنی داری وجود دارد.

حجازی، (1378)، نشان داد که هرچه سطح آمادگی جسمانی افراد بالاتر باشد، احساس بهتر و مثبت تری نسبت به شرایط و کیفیت زندگی خویش بدست می آورند و از عزت نفس بالاتری برخوردار می شوند. نتایج تحقیقات احمدی (1379)، فاضل بخششی (1379)، غرایاق زندی (1380)، غنی (1381)، رحیمی گلوگاهی (1381)، پور سلطانی (1382) و کاشف و مظفری (1385) نیز حاکی از آن است که وضعیت اجتماعی و کارکردهای اجتماعی نمونه های فعال در وضعیت بهتر و مطلوبتری نسبت به نمونه های غیر فعال بوده اند.

دوگلاس براون (2005)، بیان می کند که اساساً ورزش یک مقوله اجتماعی و حرکتی برای اجتماعی کردن افراد است. ورزش برای جوانان و بزرگسالان وسیله ای است که به هویت اجتماعی آنان کمک می کند. شرکت در ورزش، برای توسعه قابلیت های فردی ارزشمند است و باعث اجتماعی شدن افراد از طریق کسب تجارب لذت بخش و مثبت می گردد. همچنین ورزش به تربیت شهروندانی خوب برای جامعه کمک می کند.

این تحقیق نشان داد که، در میزان افسردگی بین معلمان فعال و غیر فعال تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج آمار توصیفی در این خصوص نشان داد که میانگین میزان افسردگی از عدد 3,07 در بین معلمان غیر فعال و عدد 2,06 در بین معلمان فعال می باشد. با توجه به اینکه میانگین های بالاتر نشانه اختلال است

حکایت دارد. به نظر می‌رسد این برنامه‌ها تا به این حال به خوبی موثر نبوده و نتوانسته است باعث حضور هر چه بیشتر قشر فرهنگی جامعه در اینگونه ورزشها بشود، اگر چه شرکت این قشر از جامعه در فعالیت‌های بدنه و ورزشی روز به روز بیشتر می‌شود. مشکلات ناشی از مسئولیت‌های خانوادگی و به خصوص میزان درآمد بسیار پایین خانواده‌فرهنگیان و هزینه‌های بالای زندگی می‌تواند از اساسی ترین مشکل و مانع قشر فرهنگی و با تحصیلات بالا برای عدم پرداختن به ورزش همگانی باشد.

پیشنهاد می‌گردد مسئولین به خصوص مسئولین آموزش و پرورش و همه دست اندکاران توجه ویژه‌ای نسبت به فعالیت‌های ورزشی، مخصوصاً ورزش‌های همگانی داشته باشند تا از این طریق باعث ارتقاء سطح سلامت عمومی جامعه و به خصوص معلمان گرددن. البته در این راستا شهرداری‌ها و مراکز تفریحی بایست ایجاد فضاهای و امکانات ورزشی را در سرلوحه کار خود قرار دهند. همچنین مسئولان مراکز آموزشی و غیر آموزشی نیز می‌توانند با توجه به آثار مثبت فعالیت بدنه بر سلامت عمومی، مراکز و امکاناتی در سازمان خود برای انجام ورزش و فعالیت بدنه فراهم آورند.

منابع

- Soltani, Hossein (1382); Comparison of general health of veterans and physically disabled athletes and non-athletes Doctoral dissertation of Tarbiat Moallem University.
- Hejazi, Seyed Mahmoud (1378); The effect of aerobic exercise on self-esteem of faculty members of Islamic Azad University, Mashhad Branch, Olympic Quarterly, Year 7, No. 2 and 1, pp. 201-215.
- Haddad, Navid (1376); Investigating the relationship between mental health and physical fitness of female students, athletes and non-athletes in the University of Tehran in the academic year of 1975-76.
- Rahimi Gulogah (2002); Study of the relationship between physical fitness related to health and mental health and its subscales in middle school male students in Behshahr, M.Sc. thesis, Shahid Beheshti University.
- Outline of the strategy document of the comprehensive system of physical education and sports, first volume, October 2002.
- Gharayegh Zandi, Hassan (1380); Evaluation and comparison of general health of athletic and non-athletic veterans in Tehran, Master Thesis, Shahid Beheshti University.
- Ghaffari Mozaffar, A Comparison of the Place of Control, Self-Esteem, Mental Health and Excitement in Professional, Non-Professional and Non-Athletes, M.Sc. Thesis‘,
- Ghani, Gholam Hossein (1381); A study between regular physical activity and mental health of spouses in Pasdarshahr, Tehran, M.Sc. thesis, Imam Hossein University.
- Fazel Bakhti, Mahmoud (1379); The effect of a selected exercise program (aerobic) on mental health in addicts of Sistan and Baluchestan Central Prison, M.Sc. Thesis, Tarbiat Moallem University.
- Kashif Mir Mohammad, Mozaffari Seyed Mir Ahmad, 2006, Comparison of general health of active and

در بین سالمندان زن و مرد بالای شصت سال شهر تهران نشان دادند که به طور کلی سطح سلامت عمومی در جامعه تحت بررسی با میزان فعالیت‌های بدنه فراغتی رابطه مثبت و معنی دار دارد. به بیان دیگر شرکت در فعالیت‌های بدنه مورد علاقه موجب افزایش سطح سلامت عمومی در جامعه تحت بررسی می‌گردد (حجازی، 1387).

نتایج تحقیق پاییل و همکاران (2003) نتایج حاکی از آن بود که شرکت در فعالیت‌های بدنه و ورزشی سازمان یافته و رقبای می‌تواند اثرات سودمندی در سلامت روانی و جسمانی داشت آموزان داشته باشد. ارنیوس و همکارش (2005) اذعان داشتند که افراد با فعالیت بیشتر و آمادگی بدنه بهتر سلامت عمومی مناسب تر و مطلوب تری دارند. همچنین بیز و همکاران (2007) اذعان داشتند که افراد با فعالیت بیشتر را در ارتقای سلامت عمومی جامعه مورد بررسی مثبت و مؤثر گزارش کردند. به نظر مک کریندل و همکاران (2007) فعالیت بدنه بر سلامت عمومی تأثیر معنی داری دارد و کاهش سطح فعالیت بدنه در کودکان و بزرگسالان به کاهش سلامت عمومی آنان منجر می‌شود. به علاوه فرزا و همکاران (2007) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که بین سطح فعالیت بدنه سلامت عمومی افراد ارتباط معناداری وجود دارد. و بنا بر گفته چنگ و همکارانش (2008) فعال بودن از حیث جسمانی را در وضعیت سلامت عمومی زنان جامعه مثبت و موثر گزارش کردند.

به نظر می‌رسد که فعالیت بدنه، سلامت عمومی را افزایش می‌دهد و باعث کاهش مشکلات روانی می‌شود. بنابراین افراد فعال با استفاده از هرگونه فعالیت بدنه و ورزشی ملایم تا شدید از نظر سلامت جسمانی در وضعیت بهتری از افراد غیر فعال قرار خواهند داشت. البته این احساس و درک یا تصور از سلامتی خود، ممکن است تحت تأثیر مستقیم مدت، شدت و نوع فعالیت بدنه نباشد بلکه به اثرات روانی و عاطفی حاصل از شرکت در این فعالیت‌ها مربوط باشد. با اینکه برای افزایش سطوح آمادگی جسمانی و بهبود سایر متغیرها یا شاخص‌های سلامت جسمانی مانند کاهش چربی توجه به اصول تمرین ضروری است، اما نتایج این تحقیق نشان داد شرکت در فعالیت‌های جسمانی غیرسازمانی و بدون برنامه نیز می‌تواند باعث تفاوت در احساس و تصور سلامتی عمومی بهتر باشد. همین استدلال را در مورد اثرات روانی و عاطفی شرکت در ورزش همگانی مانند اضطراب و اختلال خواب، افسردگی و کارکرد اجتماعی می‌توان بیان کرد.

نتیجه گیری

با وجود فوایند تایید شده ورزش و فعالیت بدنه بر سلامت عمومی، علی رغم سیاست‌های دولت در سالهای اخیر مبنی بر ارائه برنامه‌های مناسب در جهت تسهیل شرکت اقشار مختلف جامعه در انواع ورزش‌های همگانی سطح فعالیت بدنه در نمونه‌های شرکت کننده در تحقیق، از وجود فقر حرکتی شدید در جامعه فرهنگیان

- decreases bodily pain, improve physical functioning, and mental and general health in women", Journal of laparoendoscopic and advanced surgical techniques. Vol. 17, No. 4, pp: 440-447.
- Ishihara R.Babazono A.Kame C.Yahiro M.Nishiika K.(2005);Relationship between the change of mental health and the improvement of lifestayle and physical health Nippon Eiseigaku zasshi.60(4):9-442.
- Kenchtle B.(2004);influence of physical activity on mental wellbeing and psychiatric disorders, Article in German schweiz Rundsch Med prax.Aug 25,93 (35): 11-1403.
- Kirkcaldy BD Shephsrد RJ. Siefen RG.(2002):The relationship between Physical activity and self-hmage and problem behavior among adolescents .Soc psychiatry psychiaр Epidemiol.NOV:37(11):50-544.
- kohl,C.C.(2002)."parental Influences in youth sport",Msc, Faculty of spring field collegr.
- Mark Hamer, Emmanuel Stamatakis, Andrew Steptoe. (2008). Dose response relationship between physical activity and mental health: The Scottish Health Survey. Br J Sports Med.
- Mc Auley E.marquez DX, jerme Gj. Blissmer B.Katula j.(2002):physical activity and physique anxiety in older adults: fitness and efficacy influences . Aging Ment Health . Aug.(3):222-30.
- Connor pj, Yougested SD.(1995)influence of exercise on human sleep.Exec Sport,Sci Rev;23 : 105-34
- Paluska SA .Schwenk TL.(2000):Physical activity and mental health:current concepts.Sports Med.Mar:29(3):80-167.
- Peluso MA,Andrade LH.(2005);Physical activity and mental health: the Association between exercice and mood.Clinics. 2005 Feb,(1) 61-70.Epub Mar 1.96
- Salmon P .(2001):Effects of physical exercise on anxiety,depression and sensitivity to stress:a unifying theory. Clin psychol Rev.Fed:21(1):33-61.
- Tsutsumi T, Don BM, Zaichkowsky LD, Delizonna LL. (1997); physical fitness and psychological benefits of strength traininig in community dwelling older adults. Appl Human Sci. Niv; 16(6):66-257
- Weyerer S, Kupfer B. (1994): physical exercise and psychological health. Sport Med. Feb., 17(2) : 108-16.
- inactive faculty members of the country's universities, Journal of Motor Sciences and Sports Spring and Summer 2006; 4 (7): 11-23.
- Ganji Massoud, Rajabi Soran, Ghaffari Mozaffar, Comparison of mental health and smoking in students with religious behaviors and without religious behaviors, Mohaghegh Ardabili University, 2005
- Tarajian, Mehdi, Roozbehani, Mehdi. (1379). The relationship between the development of basic patterns of object control and the components of physical fitness related to children's health. Motor and Behavioral Sciences, 1 (1), 38-45.
- Aarnio,M.W. et al.(2002)."Associations of health related behavior,social relationships, and health status with persistent physical activity."British J sport Med.36:360-364
- Bonhauser M, Fernandez G, Puschel K, Yanez F, Montero J, Thompson B, Coronado G, (2005) , Improving Physical fitness and emontion well – being in adolescents if low socioeconomhc staus in chile : result of a schole – based controlled trial. Health promot Int . 2005 Jun ,20 (2):22- 113 .EPUD,23.
- Carmack CL, Bodereaux e, Amaral- Melendez M, Brantly PJ, de Moor C.(1999). Aerobhc fitness and leisure physical activity as moderators of the stress- Illness relation Ann Behav Med. 21(3):251-7
- Cheng, CY. & Li, Q. (2008). "Integrative review of research on general health status and prevalence of common physical health conditions of women after childbirth, women's health Issues". Vol. 18, No. 4, pp: 267-280.
- Duglas Brown, g. (2005) . Reported the social and cultutal Benefits of sport in ealgari, Canada
- De carvalho Alessandra, Ms , PT , Filho , Wilson Jacob phD. (2004), Effects of an exercise Program on function performance of institutionalized elderly, JRRD Volume 41, Number 5, pages 659- 668, September/ October jornal of Rehabilitation Research & Development.
- Ester Cerina, Eva Leslieb, Takemi Sugiyamac and Neville Owenc (2009). Associations of multiple physical activity domains with mental well-being. Mental Health and Physical Activity. Volume 2, Issue 2, Pages 55-64.
- Ferezza, EE: Shebani, KO., and Wachtel MS. (2007). "Laparoscopic gastric bypass for morbid obesity

ارجاع: مشایخ علی اکبر، حسینی علیرضا، بررسی سلامت عمومی معلمان فعال و غیر فعال شهر چمستان، مجله علوم حرکتی و رفتاری، دوره

3، شماره 2، تابستان 1399، صفحات 227-235.