

Original Research

The effect of Wii Fit Training on Hand Coordination Skills in People with Parkinson's Disease

Mohammad Rostami Pour^{1*}, Asieh Zoughdi², Elaheh Saleh tarigh³

1. Master of Motor Behavior, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2. Ph.D student in Behavioral Behavior, Kharazmi University, Tehran, Iran

3. M.Sc. Student of Psychology, Islamic Azad University Research Sciences Branch, Tehran

Received: 2019/07/05 Revised: 2019/08/16 Accepted: 2019/08/28

Abstract

Introduction& Purpose: The aim of the present study was the effects of wii fit training on hand coordination skills in people with Parkinson's disease.

Methodology: The research in this quasi-experimental study Purpose: The purpose of the present two experimental with pre-test and post-test performed well. The sample included 24 eligible patients to participate in research a number of randomly into two groups, 12 patients were treated. Consent of Mnzvrgrdyd. At the beginning of the research design of the pre Perdue attended and relevant information as a pre-test scores were recorded. After collection information began intervention training.

Results: The results showed that the errorful with high propensity of reinvestment and errorless with low propensity of reinvestment groups outperforming significantly than other groups in the retention and transfer tests. Whereas, the errorless with low propensity of reinvestment performed superior significantly than other groups in under pressure condition.

Conclusion: The results showed that the effect of training was significant on hand coordination skills in people with Parkinson's disease.

Keywords: Parkinson, Wii fit, Coordination

Citation: Mohammad Rostami Pour, Asieh Zoughdi, Elaheh Saleh tarigh, The Present Study was the Effects of Wii Fit Training on Hand Coordination Skills in People with Parkinson's Disease, Journal of Motor and Behavioral Sciences, Volume 2, Number 3, Autumn 2019, Pages 211-218.

* **Corresponding Author:** Mohammad Rostami Pour, Master of Motor Behavior, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

Email: Rostami.m500@gmail.com

تأثیر تمرینات وای فیت بر مهارت هماهنگی دستی در افراد مبتلا به بیماری پارکینسون

محمد رستمی پور^{۱*}، زهرا گلزاری^۲، الهه صالح طریق^۳

۱. کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

۲. دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

۳. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

دریافت مقاله: ۹۸/۰۴/۱۴ بازنگری مقاله: ۹۸/۰۵/۲۵ پذیرش مقاله: ۹۸/۰۶/۰۵

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تاثیر تمرینات وای فیت بر مهارت هماهنگی دستی در افراد دارای بیماری پارکینسون بود.**روش شناسی:** روش تحقیق در این پژوهش نیمه تجربی است. پژوهش حاضر با دو گروه تجربی باطرح پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفته است. نمونه شامل برابر ۲۴ نفر که شرایط لازم برای شرکت در پژوهش را داشتند. این تعداد بطور تصادفی در دو گروه، ۱۲ نفر قرار گرفتند. فرم رضایت نامه افراد منظور گردید. درآغاز طرح پژوهش افراد در پیش آزمون پردازش شرکت نمودند و اطلاعات مربوطه به عنوان نمرات پیش آزمون ثبت شد. پس از جمع آوری اطلاعات مداخله های تمرینی آغاز گردید.**نتایج:** از آمار توصیفی برای توصیف، طبقه‌بندی و تنظیم نمرات خام استفاده شد و در بخش آمار استنباطی برای اطمینان از طبیعت بودن توزیع داده‌ها از آزمون شاپیرو-ولیک، برای تعیین تجانس واریانس ها از آزمون لوین استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون p تی و تحلیل واریانس چندمتغیری (مانکوا) استفاده شد. کلیه تحلیل‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۰، در سطح معناداری $p < 0.05$ انجام گردید.**نتیجه‌گیری:** نتایج نشان داد که تاثیر تمرینات وای فیت بر مهارت هماهنگی دستی در افراد دارای بیماری پارکینسون تاثیر مثبت دارد.**واژگان کلیدی:** پارکینسون، وای فیت، هماهنگی**ارجاع:** رستمی پور محمد، گلزاری زهرا، صالح طریق الهه، تاثیر تمرینات وای فیت بر مهارت هماهنگی دستی در افراد دارای بیماری پارکینسون، مجله علوم حرکتی و رفتاری، دوره دوم، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۸، صفحات ۲۱۱-۲۱۸.**نویسنده مسئول:** محمد رستمی پور، کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.**آدرس الکترونیکی:** Rostami.m500@gmail.com

مقدمه

مهنمترین نقش عقده‌های قاعده‌ای، کنترل حرکت و تنظیم وضعیت بدن است. البته باید در نظر داشت که این سیستم همراه با قشر حرکتی و مخچه عملاً به صورت یک واحد عمل می‌کند و نمی‌توان اعمال مجازی را به طور کامل به قسمت‌های مختلف عقده‌های قاعده‌ای نسبت داد. با وجودی که انتساب یک عمل واحد به تمام عقده‌های قاعده‌ای غلط است، یکی از اثرات عمومی تحریک منتشر عقده‌های قاعده‌ای، مهار کردن تنوس عضلانی در سراسر بدن است که این اثر ناشی از پیام‌های مهاری است که از عقده‌های قاعده‌ای به قشر حرکتی و قسمت تحتانی ساقه مغز انتقال می‌یابند(لئونارد، ۲۰۰۸).

اختلالات حرکتی در اثر آسب‌های مربوط به عقده‌های قاعده‌ای با توجه به ناحیه آسیب باعث ایجاد دو مشکل در فرد می‌شوند: افزایش حرکات و کاهش حرکات. در ارتباط با افزایش حرکات به موارد زیر می‌توان اشاره کرد: لرزش^۱ این حرکات، نوسانی و ریتمیک است. کره^{۱۱} کره اشارت است از حرکات ناگهانی، نامتقارن و کوتاه مدت عضلات اندامها و صورت. در این حالت، حرکات برای چند ثانية انجام می‌شود و سپس یک طرح حرکتی دیگری پس از آن شروع می‌شود؛ بنابراین حرکات نامنظم و غیرارادی یکی پس از دیگری ایجاد می‌شود. آتنوز^{۱۲} آتنوز با حرکات مداوم، نامنظم، غیرارادی و کرمی شکل در قسمت انتهایی اندامها و تنه که ممکن است حتی در ضمن خواب هم ایجاد شوند، شناخته می‌شود و حرکت ارادی ممکن است غیرممکن باشد(لاتاش، ۲۰۱۱).

همی بالیسموس^{۱۳}. همی بالیسموس به علت ضایعه (معمولآً آسیب عروقی) هسته ساب‌تالامیک ایجاد می‌شود و این وضعیت به صورت حرکات غیرقابل کنترل پرتابی شدید و ناگهانی عضلات یک یا هر دو اندام در طرف مقابل ظاهر می‌کند. مواردی که باعث کاهش حرکات می‌شوند عبارتنداز: کندی حرکات^{۱۴}، عدم حرکت یا آکینزی^{۱۵}، دیستونی^{۱۶} یا بدقوامی ماهیچه‌ها. به انقباض غیرارادی و مداوم گروهی از عضلات که باعث وضعیت ثابت بدن می‌شود،

مغز فرمانده بدن است. درواقع، هر فعل و افعالی که در حرکات انسان صورت می‌گیرد به وسیله‌ی مغز کنترل می‌شود. مغز از دو قسمت سیستم عصبی مرکزی و محیطی تشکیل شده است. دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع می‌باشد و مغز خود دارای بخش‌های قشری و تحت قشری می‌باشد (رستمی پور و شریفی، ۱۳۹۵). بخش قشری به نواحی پیشانی، آهیانه‌ای، گیجگاهی و پس سری تقسیم می‌شود(لاتاش، ۲۰۱۱). و بخش زیر قشری گیرنده‌های ساقه مغز، تalamوس، سیستم لیمبیک، عقده‌های قاعده‌ای، تشکیلات مشبك و مخچه می‌باشند. هر کدام از قسمت‌ها در در کنترل حرکتی خاصی در گیر هستند(لاتاش، ۲۰۱۱). برای مثال، کار مخچه بیشتر در ارتباط با هماهنگی و کنترل برنامه ریزی حرکتی می‌باشد(رستمی پور و شریفی، ۲۰۱۱). آسیب به هر قسمت از مغز به از دست رفتن یک سری حرکات و نقص در اجرای حرکتی می‌شود. در بین بخش‌های زیر قشری، عقده‌های قاعده‌ای دارای اهمیت بسیار می‌باشد. عقده‌های قاعده‌ای^۲ که هسته‌های قاعده‌ای نیز خوانده می‌شوند از پنج هسته زیرقشری مغز تشکیل شده‌اند(لئونارد، ۲۰۰۸). عقده‌های قاعده‌ای از این نظر دارای اهمیت هستند که نقش مهمی در عمل کنترل حرکتی ایفا می‌کنند. هسته‌های این ناحیه به دلیل ارتباطاتی که با هم و دیگر قسمت‌های مغز دارند، در کنترل حرکت شرکت می‌کنند، اگرچه پیام مستقیم به طناب نخاعی جهت کنترل حرکتی نمی‌دهند. عقده‌های قاعده‌ای پیام‌های اولیه را از قشر مغز می‌گیرند و پیام‌های خود را از راه تalamوس به قسمت‌های مختلف قشر مغز می‌فرستند. در واقع، عقده‌های قاعده‌ای از پنج هسته تشکیل می‌شوند که عبارتنداز: پوسته^۳، هسته دمدار^۴، توده سیاه^۵، ساب‌تالامیک^۶، گوی رنگ‌پریده^۷ که پالیدوم^۸ نیز خوانده می‌شود. به هسته‌های پوسته، دمدار و گلوبوس پالیدوس با هم جسم مخلوط (کورپوس استریاتوم) می‌گویند(لاتاش، ۲۰۱۱).

- 9. Pallidum
- 10. Tremor
- 11. Chorea
- 12. Athetosis
- 13. Hemiballismus
- 14. Bradikinesia
- 15. Akinesia
- 16. Dystonia

- 1. Latash
- 2. Basal ganglia
- 3. Leonard
- 4. Putamen
- 5. Caudate
- 6. Substantia nigra
- 7. Subthalamic
- 8. Globus pallidus

کمتر می‌شود، مثلاً اگر بیمار بخواهد یک لیوان را بردارد لرزش کم شده یا ناپدید می‌شود و البته خواب نیز باعث از بین رفتن این لرزش می‌شود. در مقابل اگر بیمار دچار استرس روحی شود یا خسته شود، لرزش بیشتر می‌شود (موریس، ۲۰۰۰). این افراد به دلیل نشانه‌های بیماری مثل لرزش، سفت شدن عضلات، اختلال در وضعیت بدن و کند شدن حرکات در اجرای حرکات ظرفی و درشت دچار مشکلات بسیاری می‌شوند و به همین خاطر اکثر این افراد در انجام کارهای روزانه خود نیز ناتوان می‌شوند. آموزش دوباره حرکات ظرفی، می-تواند تاثیر بسزایی در کمک به خودبیاری و استقلال دوباره این افراد داشته باشد. با توجه به مزیت وجود هماهنگی و توانایی دستکاری و نقش حرکات ظرفی در رابطه با بهبود پیامدهای حرکتی و کیفیت زندگی در بیماران پارکینسون تلاش برای بهبود حرکات ظرفی و کاستن ترمور دست در این افراد امری پذیرفته شده است. در واقع، یکی از نشانه‌های بیماری پارکینسون ضعف در هماهنگی چشم-دست و چشم-پا می‌باشد. هماهنگی برای انجام کارهای روزمره، به خصوص کارهای که به دقت نیاز دارند، ضروری است. تحقیقات متعدد نشان داده اند که ارائه مداخلات باعث بهبود هماهنگی در افراد پارکینسونی می‌شود. برای مثال، گودوین و همکاران^۹ (۲۰۰۸) در یک تحقیق جامع نشان دادند که تمرینات هماهنگی، فعالیتهای هوایی، و فعالیتهای تعادلی باعث بهبود هماهنگی و تعادل در افراد پارکینسون می‌شود. همچنین آوارز و همکاران^{۱۰} (۲۰۱۲) نشان دادند که تمرینات با تأکید بر هماهنگی چشم-پا باعث بهبود روان شدن راه رفتن و اجرای تکالیف چشم-پا می‌شود. در همین راستا رومیچ و همکاران^{۱۱} (۲۰۱۳) در تحقیقی به بررسی تمرینات با تخته تعادل و حرکات نوسانی به بررسی هماهنگی بین اندامی در افراد پارکینسونی پرداخت. آمانو و همکاران^{۱۲} (۲۰۱۵) در تحقیقی به بررسی انعطاف پذیری مهارت‌های هماهنگی، بر مهارت‌های هماهنگی دگرجانبی در افراد پارکینسون نشان دادند که اینگونه تمرینات باعث بهبود مهارت‌های هماهنگی در این افراد می‌شود. اشبورن و همکاران^{۱۳} (۲۰۱۴) در تحقیقی به بررسی هماهنگی کل

دیستونی گویند. دیستونی ممکن است باعث تغییر شکل بدن گردد (سلمان و رستمی پور، ۱۳۹۵).

شایعترین بیماری عقده‌های قاعده‌ای، بیماری پارکینسون^۱ است که معمولاً در دهه پنجم زندگی رخ می‌دهد. مهمترین علایم بیماری پارکینسون شامل کندی حرکت، لرزش در حالت استراحت، عدم حرکت یا آکینزی، و سخت شدگی^۲ که نوع خاصی از سفتی عضلانی است، می‌باشد.

بیماری پارکینسون^۳، یک اختلال عصبی پیشرونده است و بعد از آزادی‌میر به عنوان دومین بیماری شایع مخرب عصبی مطرح است، که شیوع آن با بالا رفتن سن افزایش می‌یابد (rstemi پور و شریفی، ۱۳۹۵). بعضی از نشانه‌های این بیماری ممکن است نادیده گرفته شود زیرا علایم آن شبیه نشانه‌های پیری و کهنسالی می‌باشد. در واقع، پارکینسون یکی از بیماری‌های مخرب اعصاب است که با علایمی همچون کندی حرکات بدن، خشکی و سختی عضلات و رعشه‌ای استراحتی همراه است. در این بیماری سلول‌های تولید کننده دوپامین^۴ در مغز میانی تخریب شده، در نتیجه انتقال عصبی در عقده‌های قاعده‌ای مغز دچار اختلال می‌شود. بیماری پارکینسون به تدریج شروع می‌شود. مشخصه نوروپاتولوژی این بیماری تخریب نرون‌های دوپامینرژیک موجود در هسته جسم سیاه مغز میانی است؛ ولی علایم بالینی این بیماری تقریباً به دنبال از بین رفتن حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد از نرون‌های دوپامینرژیک جسم سیاه بروز می‌نماید (فلاورس، ۱۹۷۸). مشخصه مهم این بیماری همان لرزش در وضعیت استراحت است که شیوع آن بیشتر در سنین پیری است، اما در جوانان هم دیده می‌شود. علایم بیماری پارکینسون عبارت است از: ارتعاش و لرزش^۵ دست و پا در حالت استراحت (پیترسون و همکاران^۶، ۲۰۰۸)، کندی حرکات^۷، سختی و خشک شدن دست،^۸ پا و بدن و اختلال تعادل (دوس سانتوس، ۲۰۱۲)، که البته این موارد چهار علامت اصلی را تشکیل می‌دهند. شایعترین علامتی که پارکینسون با آن شروع می‌شود، لرزش در حالت استراحت است و آن را به حالت پول شمردن شبیه می‌کنند. این لرزش با انجام کار

- 7. Bradykinesia
- 8. Rigidity
- 9. Goodwin et al
- 10. Alvarez
- 11. Roemmich et al
- 12. Amano et al
- 13. Ashburn et al

- 1. Parkinson's disease
- 2. Rigidity
- ۲. Parkinson's Disease
- 4. Dopamine
- 5. tremor
- 6. Piterson et al

و همکاران^۴ (۲۰۱۱) نشان دادند که تمرينات وای فیت بر تعادل، عملکرد حرکتی، و سرعت راه رفتن در افراد پارکینسونی تأثیر مثبتی دارد. همچنین در زمینه تعادل ایستا و پویا نتایج به سود تمرينات وای فیت می باشد(گیل- گومز و همکاران^۵، ۲۰۱۱). شاید بتوان گفت که بهترین مقاله در این زمینه تمرينات و پارکینسون مقاله مروری هرتز و همکاران (۲۰۱۳) باشد. در این مقاله هرتز و همکاران نشان دادند که تمرينات وای فیت تأثیر مضاعف و مثبتی بر تعادل ایستا و پویا، هماهنگی، کنترل قامت، کاهش افتادن ها، بهبود نوسان قامتی دارد.

روش شناسی

آزمون پوردو و پگبورد به صورت گستردۀ در توابخشی کودکان، بزرگسالان و سالمندان استفاده می شود. این آزمون مهارت دستی یعنی حرکات درشت و ظرفیت اندام فوقانی و هماهنگی یک دستی و دو دستی را ارزیابی می کند و در اصل برای استخدام در مشاغل صنعتی طراحی شده است. این ابزار علاوه بر ارزیابی مهارت نوک انگشتی، عملکرد بازو، دست و انگشتان را نیز ارزیابی می کند. پایابی آزمون – باز آزمون این آزمون در خرده آزمون های مختلف از ۰/۶۰ تا ۰/۹۱ با یک بار آزمون و از ۰/۸۲ تا ۰/۰ با سه بار آزمون در افراد بالای ۶۰ سال متغیر است. از جمله ابزارهایی که در کار درمانی برای ارزیابی مهارت های حرکتی ظرفیت اندام فوقانی در بیماران پارکینسون استفاده می شود، آزمون پوردو و پگبورد می باشد. در سال ۱۹۹۳، باس و همکارانش میزان همخوانی درونی این آزمون را در بیماران پارکینسون بالا ([\(الفاکرونباخ <۰/۹\)](#)) گزارش کردند. برای ارزیابی یادگیری مهارت دستی و هماهنگی از این تست استفاده شد. برای تست فرد پشت میزی به ارتقای ۳۰ اینچ نشسته، صفحه تست به طور مستقیم جلوی او روی میز قرار می گرفت. سپس به آزمودنی توضیح داده می شد که این تست نشان می دهد که شما چگونه می توانید با دست هایتان کار کنید. بعد آزمودنی میخ ها را یکی یکی با دست غالب خود از حفره برداشته و در سوراخها قرار می داد. زمان در نظر گرفته شده ۳۰ ثانیه بود و پس از اتمام زمان تعداد میخ های قرار داده شده در سوراخها شمارش می شد. این آزمون ۳ بار برای هر فرد

بدن در افراد مبتلا به پارکینسون پرداختند. نتایج نشان داد که تمرينات با رویکرد هماهنگی بر هماهنگی کل بدن در افراد پارکینسون اثر می گذارد.

اوژگونل و همکاران^۱ (۲۰۱۶) در تحقیقی به بررسی استفاده از کنسول بازی های ویدئویی به بررسی مهارت های حرکتی ظرفیت، هماهنگی، و تعادل افراد پارکینسونی پرداختند. نتایج نشان داد که بازی های ایکس باکس کینکت و تمرينات وای فیت باعث بهبود تعادل، هماهنگی، و مهارت های حرکتی ظرفیت می شود. در تحقیقی گورنیا و همکاران^(۲) به بررسی هماهنگی در افراد پارکینسونی پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که افراد پارکینسون در مهارت های حرکتی ظرفیت و هماهنگی تاخیرات رشدی دارند. همچنین نشان دادند که با طراحی تمرين ناسب می توان هماهنگی و مهارت های حرکتی ظرفیت را بهبود بخشید.

نتایج تحقیقات وی نشان داد که تمرينات نوسانی تأثیر معناداری بر هماهنگی بین بین اندامی دارد. یکی از ابزارهای که به عنوان مداخله در جوامع اروپایی بیشترین تأثیر گذاری را دارد، بازی های وای فیت می باشند. نیتندو وای فیت، یک مدار الکترونیکی است که پالس های وزن و حرکت بدن را شناسایی کرده و به دستگاه نیتندو وای فیت منتقل می کند(هرتز و همکاران^۲، ۲۰۱۳). در ابتدای بازی به بازیکن آموزش داده می شود که طبق حرکاتی که شخصیت اصلی حرکت می کند، روی صفحه وی فیت حرکت کند. این کارکرد طبق یک برنامه زمانی مشخص، باعث تناسب اندام و کاهش وزن می شود. گفتنی است که دستگاه وای، از شما قد و وزن شما را خواهد پرسید، و طبق این مشخصات، برنامه ورزشی مناسب شما را ارائه می کند. وای فیت قطعه ای کاملاً هوشمند با قابلیت های خاص و ویژه برای افراد مسن، پدر و مادر ها، پسران و دختران جوان، کودکان و همچنین افراد اختلالی بسیار مفید است. تحقیقات متعدد در خارج از کشور به نتایج معناداری در استفاده از این بازیها دست یافته اند. برای مثال، پایمونت^۳ در سال ۲۰۱۳ به بررسی تأثیر تمرينات وای فیت و تمرينات شناختی بر زندگی روزمره افراد پارکینسونی پرداخت؛ نتایج نشان داد که این تمرينات تأثیر مثبتی بر کیفیت زندگی روزمره افراد پارکینسونی دارد. در همین راستا، زیرگن

4. Zettergren et al
5. Gil-Gomez et al

1. Özgönenel et al
2. Hertz et al
3. Piemonte et al

انجام می شد، میانگین محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد (حوالی ۲۰۱۲).

دو گروه در ۱۰ جلسه تمرینی شرکت داشتند هر جلسه تمرین با ۱۰ دقیقه گرم کردن و تمرینات کششی عضلات دست و بازو آغاز شده و در نهایت با ۱۰ دقیقه سرد کردن ختم می شده است، که کل تمرین زمانی نزدیک به یک ساعت تا یک و نیم ساعت را شامل می شد. تمرین اصلی شامل جاگذاری ۲۵ میخ، ۴۰ واشر و ۲۰ کلار در جعبه پکبود با دست غالب و دست دیگر بوده که در هر جلسه سی ثانیه ۲۰ بار انجام می شده است. که در طول یک هفته پشت سر هم انجام شد. تمرینات در مکانی آرام انجام می شد تا شرکت کنندگان تمرکز لازم را داشته باشند. لازم به ذکر هست که استراحت کافی و لازم بسته به شرایط فرد در بین تمرینات و دفعات تمرین داده می شد.

نتایج

روش تحقیق در این پژوهش از نوع نیمه تجربی است. پژوهش حاضر با دو گروه تجربی، که یک گروه تمرینات وای فیت و یک گروه تمرینات سنتی با طرح پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفته هست. نمونه نهایی مشتمل بر ۲۴ نفر که شرایط لازم برای شرکت در پژوهش را داشتند. این تعداد بطور تصادفی دو گروه ۱۲ نفره قرار گرفتند. سپس فرم رضایت نامه افراد منظور گردید. در آغاز طرح پژوهش افراد در پیش آزمون پردازش شرکت نمودند و اطلاعات مربوطه به عنوان نمرات پیش آزمون ثبت شد. پس از جمع آوری اطلاعات مداخله های تمرینی آغاز گردید. نحوه نمره گذاری در آزمون پکبود بدین صورت بود که با شمارش تعداد جاگذاری میخ، واشر و کلار نتایج بدست آمده به عنوان نمرات پیش آزمون و پس آزمون بدست آمد.

جدول ۱. میانگین و انحراف استاندارد هماهنگی دست در دو گروه

متغیر	میانگین	انحراف استاندارد
گروه کنترل	۳۰,۶۲	۳,۳۹
گروه تجربی	۳۷,۸۸	۳,۵۴



شکل ۴-۵. نمودار میانگین پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی

جدول ۴-۱۰. نتایج آزمون T وابسته

همانگی دستی	متغیر	میانگین	انحراف استاندارد	خطای استاندارد میانگین	مقدار t	درجه آزادی	معنی داری
-۷,۲۵	۰,۸۴۵	۰,۲۹۹	-۲۴,۲۶۳	۷	-	۰,۰۰۰	

بحث

همچنین در بحث هماهنگی و تعادل تمرینات وای فیت می‌تواند به درگیری گیرنده‌های حس عمقی(برای مثال، دوک‌های عضلانی، اندام‌های وتری -گلزاری، و گیرنده‌های مفصلی) پرداخته و باعث تسهیل در این افراد مبتلا به پارکینسون شود. بنابراین، مربیان، کاردرمان‌ها، فیزیوتراپ‌ها، و متخصصان می‌توانند از این تمرینات به مشابه تمرینات سنتی از آن در مکان‌های مختلف برای بهبود هماهنگی، تعادل، و بهبود لرزش دست از آن استفاده کنند.

منابع

- Alvarez MV, Grogan PM, Rodriguez M: Connecting with Kinect (R) to improve motor and gait function in Parkinson's disease. *Mov Disord* 2012, 27:S297–S297.
- Amano, S., Hong, S. L., Sage, J. I., & Torres, E. B. (2015). Behavioral inflexibility and motor dedifferentiation in persons with Parkinson's disease: Bilateral coordination deficits during a unimanual reaching task. *Neuroscience letters*, 585, 82-87.
- Ashburn, A., Kampshoff, C., Burnett, M., Stack, E., Pickering, R. M., & Verheyden, G. (2014). Sequence and onset of whole-body coordination when turning in response to a visual trigger: comparing people with Parkinson's disease and healthy adults. *Gait & posture*, 39(1), 278-283.
- Assad O, Hermann R, Lilla D, Mellies B, Meyer R, Shevach L, Siegel S, Springer M, Tiemke S, Voges J, Wieferich J, Herrlich M, Krause M, Malaka R: Motion-based games for Parkinson's disease patients. In Entertainment computing - ICEC 2011. Volume 6972.
- Dahdal, P., Meyer, A., Chaturvedi, M., Nowak, K., Roesch, A. D., Gschwandtner, U., & Fuhr, P. (2016). Fine motor function skills in patients with Parkinson disease (PD) with and without mild cognitive impairment (MCI). *Parkinsonism and Related Disorders*, (22), e9.
- dos Santos A, Pegollo F, Alencar R, Avanzi R, Pompeu JE: A new tool for assessment and balance training of patients with Parkinson's disease based on low cost commercial Wii balance Board. *Mov Disord* 2012, 27(Suppl 1):898.

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات وای فیت تأثیر مثبت و معناداری در هماهنگی اندام‌های فوقانی(چشم-دست) در افراد مبتلا به بیماری پارکینسون دارد. می‌تواند اذعان کرد که شایع‌ترین مشکل بیماران پارکینسونی عدم لرزش دست و عدم هماهنگی در حرکات طریف می‌باشد که مشکلات عدیده‌ای از جمله ناهمانگی حرکتی به خصوص در حرکات طریف مثل بیستن بند کفش‌ها، سوزن نخ داده‌اند که در مقایسه با سالم‌دان سالم و بی تحرک در این بیماران بسیار بیشتر است (راینسون، ۲۰۰۵). نتایج تحقیق حاضر با پژوهش گودوین و همکاران(۲۰۰۸)، آوارز و همکاران(۲۰۱۲)، رومیچ و همکاران(۲۰۱۳)، آمانو و همکاران(۲۰۱۵) که در تحقیقاتشان به بررسی تمرینات هماهنگی (به خصوص تمرینات وای فیت) و تأثیر آن بر هماهنگی پرداختند، همسان است. اشبون و همکاران(۲۰۱۴) در تحقیقی به بررسی هماهنگی کل بدن در افراد مبتلا به پارکینسون پرداختند و نشان دادند که تمرینات با رویکرد هماهنگی بر هماهنگی کل بدن در افراد پارکینسون اثر می‌گذارد.

همچنین با تحقیقات اوزگونل و همکاران(۲۰۱۶)، گورنیا و همکاران(۲۰۱۳) به بررسی تأثیرات تمرینات تخصصی وای فیت بر هماهنگی در افراد پارکینسونی پرداختند، مغایرت دارد. محققان در هر دو تحقیق نشان دادند که که با طراحی تمرین مناسب می‌توان هماهنگی و مهارت‌های حرکتی طریف را بهبود بخشید. از دلایل هم راستا بودن تحقیق حاضر با تحقیقات ذکر شده تخصصی بودن پر تکل تمرینی حاضر، مدت زمان مداخله صورت گرفته، ایزار دقیق اندازه گیری باشد.

نتیجه گیری

همانطور که قبلاً بیان شد، افراد مبتلا به پارکینسون ضعف عمدۀ ای در لرزش دست، هاهنگی، و تعادل دارند. خود لرزش دست باعث عدم هماهنگی جسم – دست می‌شود. تمرینات وای فیت که شامل یک سری نرم افزار‌های اختصاص یافته است این موقعیت را فراهم می‌کند، که یک ارتباط قوی بین مسیرهای صعودی و نزولی برای افراد مبتلا به پارکینسون را بهبود بخشد. هماهنگی حرکتی از ارتباط بین عصب-عضله و پردازش دقیق به خصوص در مخچه به وجود می‌آید. تحقیقات نشان داده اند که با طراحی تمرینات ویژه(برای مثال، وای فیت) می‌توان هماهنگی را در این افراد بهبود بخشد.

17. Ridgel, A. L., Vitek, J. L., & Alberts, J. L. (2009). Forced, not voluntary, exercise improves motor function in Parkinson's disease patients. *Neurorehabilitation and neural repair*.
18. Ringendahl, H. (2002). Factor structure, normative data and retest-reliability of a test of fine motor functions in patients with idiopathic Parkinson's disease. *Journal of clinical and experimental neuropsychology*, 24(4), 491-502.
19. Roemmich RT, Field AM, Elrod JM, Stegemöller EL, Okun MS, Hass CJ. Interlimb coordination is impaired during walking in persons with Parkinson's disease. *Clinical Biomechanics*. 2013 Jan 31;28(1):93-7.
20. Roemmich, R. T., Field, A. M., Elrod, J. M., Stegemöller, E. L., Okun, M. S., & Hass, C. J. (2013). Interlimb coordination is impaired during walking in persons with Parkinson's disease. *Clinical Biomechanics*, 28(1), 93-97.
21. Shumway-Cook A, Woollacott MH 2012 Motor control, translating research into clinical practice, 4th edn. Baltimore, MD, Lippincott Williams & Wilkins.
22. Sterling, N. W., Lichtenstein, M., Lee, E. Y., Lewis, M. M., Evans, A., Eslinger, P. J., ... & Huang, X. (2016). Higher Plasma LDL-Cholesterol is Associated with Preserved Executive and Fine Motor Functions in Parkinson's Disease. *Aging and Disease*, 7(3), 237.
23. Stern Y, Mayeux R, Rosen J, Ilson J (1983) Perceptual motor dysfunction in Parkinson's disease: a deficit in sequential and predictive voluntary movement. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 46: 145–151.
24. van der Kooij H, van Asseldonk EH, Geelen J, van Vugt JP, Bloem BR (2007) Detecting asymmetries in balance control with system identification: first experimental results from Parkinson patients. *J Neural Transm* 114: 1333–1337
25. Zettergren KK, Antunes MS, Canhao JM, Lavallee C: The effects of Nintendo Wii Fit on gait speed, balance and functional mobility on idiopathic Parkinson's disease: a case study. *Gerontologist* 2011, 51:70–70.
7. Flowers K (1978a) Some frequency response characteristics of parkinsonism on pursuit tracking. *Brain* 101: 19–34.
8. Flowers K (1978b) Lack of prediction in the motor behaviour of parkinsonism. *Brain* 101: 35–52.
9. Gil-Gomez JA, Llorens R, Alcaniz M, Colomer C: Effectiveness of a Wii balance boardbased system (eBaViR) for balance rehabilitation: a pilot randomized clinical trial in patients with acquired brain injury. *J Neuroeng Rehabil* 2011, 8:30.
10. Goodwin VA, Richards SH, Taylor RS, Taylor AH, Campbell JL: The effectiveness of exercise interventions for people with Parkinson's disease: A systematic review and meta-analysis. *Mov Disord* 2008, 23:631–640.
11. Hertz NB, Mehta SH, Sethi KD, Jackson P, Hall P, Morgan JC: Nintendo Wii rehabilitation ("Wii-hab") provides benefits in Parkinson's disease. *Parkinsonism Relat Disord* 2013, 19:1039–1042.
12. Mhatre PV, Vilares I, Stibb SM, Albert MV, Pickering L, Marciniak CM, Kording K, Toledo S: Wii fit balance board playing improves balance and gait in Parkinson Disease. *J Am Phys Med* 2013, 5:769–777.
13. Morris M, Iansek R, Smithson F, Huxham F (2000) Postural instability in Parkinson's disease: a comparison with and without a concurrent task. *Gait Posture* 12: 205–16.
14. Özgönenel, L., Çağırıcı, S., Çabalar, M., & Durmuşoğlu, G. (2016). Use of Game Console for Rehabilitation of Parkinson's Disease. *Balkan Medical Journal*, 33(4), 396.
15. Peterson DS, Plotnik M, Hausdorff JM, Earhart GM. Evidence for a relationship between bilateral coordination during complex gait tasks and freezing of gait in Parkinson's disease. *Parkinsonism & related disorders*. 2012 Nov 30;18(9):1022-6.
16. Pompeu JE, Mendes FAD, da Silva KG, Lobo AM, Oliveira TD, Zomignani AP, Piemonte MEP: Effect of Nintendo Wii (TM)-based motor and cognitive training on activities of daily living in patients with Parkinson's disease: A randomised clinical trial. *Physiotherapy* 2012, 98:196–204.